



ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DE SAÚDE



CUNCURSO PÚBLICO Nº 002/2005

Cargo: Enfermeiro

## Instruções Gerais

### Caro Candidato:

Leia com atenção e cumpra rigorosamente as seguintes instruções. Elas são parte da prova e das normas que regem este Concurso Público.

1. O Caderno de Provas contém **80 questões** a serem respondidas. Recebido da fiscalização da sala, você deve conferi-lo, verificando se ele está completo. Caso contrário, deve solicitar a sua substituição.
2. O Caderno de Provas pode ser usado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos etc.).
3. O tempo de duração desta prova é de **4 horas**, incluída a leitura das instruções e o preenchimento do cartão de leitura óptica (cartão de respostas), não lhe sendo permitida a retirada da sala antes de transcorrida uma hora do início da mesma.
4. Cada questão oferece **5 alternativas de resposta representadas pelas letras a, b, c, d, e, sendo somente uma correspondente à resposta correta.**
5. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte integrante da mesma.
6. Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou socorrer-se de consultas a livros, anotações, agendas eletrônicas, gravador, usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares ou qualquer instrumento receptor/transmissor de imagens.
7. No **CARTÃO DE LEITURA ÓPTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS)**, você deve preencher somente **uma alternativa (a, b, c, d, e) de cada questão, totalmente com caneta de ponta grossa azul ou preta, suficientemente pressionada**, conforme o exemplo:

95	<input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
96	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
97	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input checked="" type="checkbox"/>

8. Ao final da prova, você deve devolver à fiscalização da sala:
  - a) **O CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente assinado no verso**, sem amassá-lo ou dobrá-lo, **porquanto ele é insubstituível.**
  - b) **O CADERNO DE PROVAS.**
9. A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou que vier com outra assinalação que não a prevista no item 7, **é nula.**
10. O gabarito oficial da Prova será divulgado, nos endereços **www.saude.ce.gov.br** e **www.conesul.org**, em até cinco dias após a realização das provas.
11. Confira se sua prova corresponde ao cargo que você se inscreveu. Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal.

**BOA PROVA!**



# Conhecimentos de Saúde Coletiva

1. Um paciente de 65 anos sofre um acidente vascular cerebral e é encaminhado a uma unidade hospitalar de referência terciária na região onde mora, em uma grande capital Brasileira. Seus familiares são informados, à porta do setor de emergência, que não há leito disponível de UTI, e que, enquanto aguarda disponibilidade, o paciente terá de permanecer no setor de pronto-atendimento.

Qual o princípio fundamental do Sistema Único de Saúde Brasileiro que está sendo ameaçado no caso em questão?

- a) Municipalização da gestão dos serviços de saúde.
  - b) Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
  - c) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua condição de saúde.
  - d) Universalidade de acesso aos serviços de saúde.
  - e) Igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
2. Uma equipe de saúde da família atuando em uma comunidade de município do interior do Estado, constatando a alta prevalência de subnutrição infantil em sua área de abrangência, organizou sua agenda de trabalho destinando quatro turnos da semana para o atendimento prioritário de crianças e gestantes identificadas com essa condição clínica.

Atuando desta forma, que princípio da atenção básica à saúde está sendo privilegiado pela equipe?

- a) Qualidade da assistência.
  - b) Equidade.
  - c) Integralidade.
  - d) Participação social.
  - e) Gestão compartilhada.
3. Uma equipe de saúde da família estrutura-se para iniciar sua atuação em uma comunidade no interior do Estado, com cerca de 800 famílias vivendo na zona rural. Na primeira semana de trabalho, um infindável número de pessoas acorreu à unidade, obrigando os profissionais a atender intensivamente, em consultas médicas, odontológicas e de enfermagem. Nem todos os pacientes podiam ser atendidos por falta de tempo. O mesmo ocorreu nas semanas seguintes, apesar do esforço da equipe de “esvaziar” a agenda.

Qual a alternativa que melhor define o problema dessa equipe?

- a) Falta de capacitação técnica da equipe.
  - b) Análise inapropriada da situação da comunidade assistida.
  - c) Falta de organização da atenção à demanda.
  - d) Equívocos na divisão de responsabilidades entre os membros da equipe.
  - e) Limitações no sistema de referência e contra-referência da Unidade.
4. O gestor do sistema de saúde municipal tem, por diretriz constitucional, importante papel na viabilização das políticas de saúde para a sua comunidade. Qual das seguintes alternativas é **incorreta** em relação à sua responsabilidade de gestão?
- a) Gerenciar o Sistema Municipal de Saúde na organização e na execução das ações de atenção básica.
  - b) Desenvolver as atividades de: realização do cadastro, contratação, controle, avaliação, auditoria e pagamento aos prestadores dos serviços contidos no PAB localizados em seu território e vinculados ao SUS.
  - c) Firmar o Pacto dos Indicadores da Atenção Básica com o Estado.
  - d) Garantir a estrutura física necessária para a realização das ações de atenção básica.
  - e) Assumir, em caráter transitório, a gestão da atenção à saúde de municípios circunvizinhos que ainda não estão estruturados.

5. Que conceito epidemiológico define um problema espacialmente localizado, temporalmente ilimitado, habitualmente presente entre os membros de uma população e cujo nível de incidência se situe sistematicamente nos limites de uma faixa que foi previamente convencionada para uma população e época determinadas?
- Epidemia.
  - Endemia.
  - Conglomerado de casos.
  - Caso alóctone.
  - Caso autóctone.
6. As Macrorregiões de Saúde são espaços territoriais formados por um conjunto de microrregiões que convergem para os pólos terciários. Com maior capacidade para resolver a complexidade do setor saúde, no Estado do Ceará, elas estão assim distribuídas:
- Sobral, Crateús, Barbalha.
  - Sobral, Fortaleza, Barbalha.
  - Sobral, Cariri, Barbalha.
  - Sobral, Cariri, Fortaleza.
  - Sobral, Crateús, Fortaleza.
7. Quando a Unidade Básica de Saúde esgotar sua capacidade de resolução, a integralidade da assistência deve ser respeitada estabelecendo o Sistema de:
- referência e contra-referência.
  - orientação em saúde.
  - hospitalização do paciente.
  - informação à família.
  - apoio da Unidade de Saúde mais próxima.
8. Qual o objetivo do Sistema Estadual de Saúde, quando constitui uma política de organização microrregional, estabelecendo entre os municípios pactos de integração e interdependência de ações?
- Tornar as microrregiões independentes.
  - Resolver nas microrregiões todos os problemas inerentes a saúde da população.
  - Compartilhar soluções para problemas em nível microrregional.
  - Ofertar em seus territórios atendimento de alta complexidade.
  - Dotar o nível microrregional de independência dos Conselhos de Saúde.
9. A participação da comunidade nos Conselhos e Conferências de Saúde representa garantia constitucional:
- de que a população poderá participar do processo de formulação de políticas de saúde.
  - de que a população receberá apoio do gestor municipal.
  - da aplicação dos incentivos em saúde.
  - de que a população definirá os problemas políticos e de saúde.
  - de que a população participará com pelo menos 25% de representação.
10. Qual das seguintes alternativas apresenta uma das áreas estratégicas de ação do Programa de Saúde da Família, no âmbito do estado do Ceará?
- Controle da dengue.
  - Eliminação do calazar.
  - Controle do câncer.
  - Controle das doenças cardiovasculares.
  - Ações de Saúde Bucal.

11. Considerando o modelo concebido para o Programa de Saúde da Família, qual a alternativa **incorreta**?

- a) Os parâmetros de cobertura apontam que cada equipe de saúde da família será responsável por, no mínimo, 2.400 e, no máximo, 4.500 pessoas.
- b) Em regiões de alta densidade demográfica, como nos grandes centros urbanos, outros modelos de organização da atenção à saúde são preconizados, ficando o Programa de Saúde da Família orientado para as periferias das cidades e para a zona rural.
- c) É necessário que a ESF atue em um território definido, sabendo planejar adequadamente suas ações com base nas necessidades da população.
- d) Municípios com menores índices de desenvolvimento humano (IDH) e com melhores indicadores de saúde bucal são prioritariamente favorecidos com incentivos financeiros para a saúde bucal.
- e) A composição das equipes de uma Unidade de Saúde da Família recomendada pelo Ministério da Saúde é de um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um Atendente de Consultório Dentário (ACD) e/ou um Técnico de Higiene Dental (THD) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

12. Constitui diretriz para implantação da Política Nacional de Humanização:

- a) A verticalização dos processos de trabalho.
- b) A priorização do atendimento conveniado.
- c) O apoio à gestão municipal no planejamento normativo.
- d) O estímulo às práticas resolutivas.
- e) A priorização do planejamento centralizado na Unidade Básica.

13. O conceito ampliado de Saúde é norteado para:

- a) a assistência centrada na doença.
- b) o atendimento individualizado e a quem procura.
- c) um modelo de atenção integral à saúde.
- d) o tratamento diferenciado aos pacientes contribuintes.
- e) nenhuma das situações acima.

14. Qual a característica do modelo de assistência de saúde estruturado pela Previdência Social brasileira predominante nas décadas anteriores ao SUS?

- a) Provia assistência universal, fortalecendo o setor privado.
- b) Centrava-se na prática clínica, hospitalocêntrica.
- c) Visava a integralidade e a equidade.
- d) Fundamentava-se na vigilância epidemiológica e na prática interdisciplinar.
- e) Estruturava-se de forma a integrar práticas clínicas e coletivas.

15. Pode-se afirmar que atenção primária de saúde, no momento atual de implementação da atenção básica no Brasil, vem sendo considerada como:

- a) um conjunto de medidas simples desenvolvidas somente por elementos da própria comunidade.
- b) uma política de saúde que se apropria de tecnologia especializada para atender especialmente as demandas clínicas.
- c) um nível de assistência com práticas especificamente de vigilância epidemiológica, universalmente acessíveis ao indivíduo, à família e à comunidade.
- d) um conjunto de ações complexas de alta capacidade resolutiva e ao mesmo tempo alta sensibilidade diagnóstica, para atuar corretamente nas demandas primárias e propor encaminhamentos adequados.
- e) um conjunto de ações de assistência médica de forma simplificada e barata e que tem como objetivo ampliar a cobertura dos serviços para a população mais carente.

16. Qual alternativa é **incorreta** em relação aos fundamentos do Programa Saúde da Família?
- a) É uma estratégia de reorientação do modelo assistencial.
  - b) Traduz uma concepção positiva de saúde fundamentada pelo paradigma da produção social da saúde.
  - c) Estabelece uma prática sanitária da vigilância da saúde alicerçada em três pilares básicos: o território, os problemas de saúde e a intersetorialidade.
  - d) É uma prática de ações individuais e coletivas que incorporam os valores de uso da coletividade.
  - e) É uma prática hegemônica da clínica fundamentada na história evolutiva da espécie e na história individual.
17. Qual a alternativa que melhor sintetiza o conceito de “área de responsabilidade de uma equipe de saúde da família, conforme critérios de acessibilidade geográfica e de fluxo da população”?
- a) Unidade Básica de Saúde.
  - b) Planejamento Estratégico.
  - c) Território.
  - d) Modelo Assistencial.
  - e) Abrangência das Ações de Saúde.
18. Qual a alternativa que contém uma concepção **incorreta** das funções da vigilância epidemiológica em nível local?
- a) Estabelecer as condições de implantação de políticas ambientais na atenção básica.
  - b) Identificar e monitorar condições de vulnerabilidade da coletividade aos agravos de saúde.
  - c) Descrever a ocorrência de agravos de saúde na coletividade.
  - d) Estimar a magnitude da morbidade e da mortalidade para problemas selecionados.
  - e) Recomendar medidas para prevenir e controlar a ocorrência de agravos.
19. Qual a alternativa correta em relação às mudanças no perfil epidemiológico brasileiro nas duas últimas décadas?
- a) Aumento da expectativa de vida e diminuição da mortalidade infantil.
  - b) Redução da mortalidade por câncer de mama e controle da dengue.
  - c) Redução da incidência de doenças cardiovasculares, em detrimento do aumento da incidência de câncer.
  - d) Erradicação de determinadas doenças imunopreveníveis como o sarampo e a poliomielite.
  - e) Aumento da mortalidade infantil e reintrodução da dengue.
20. Qual alternativa está **incorreta** como ação de vigilância sanitária?
- a) Fiscalização das condições sanitárias dos criadouros de animais da zona urbana e rural.
  - b) Fiscalização das condições sanitárias de águas e esgoto.
  - c) Monitoramento de morbidade e mortalidade de agravos na população.
  - d) Licenciamento e fiscalização de indústrias que produzem medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos.
  - e) Fiscalização de estabelecimentos que comercializam e distribuem gêneros alimentícios, bem como empresas que manipulam alimentos.

# Conhecimentos Específicos

21. Foi prescrito para um cliente 500 ml de soro glicosado a 10%. A Unidade Básica de Saúde dispõe de tubos de 500 ml de soro glicosado a 5% e de ampolas de glicose a 50% contendo 20 ml. Quantas ampolas de glicose hipertônica são necessárias para obter o soro glicosado a 10%?
- a) 1,5 ampola
  - b) 2 amplas
  - c) 2,5 ampolas
  - d) 3ampolas
  - e) 3,5 ampolas
22. Um médico prescreveu 1.000 ml de soro fisiológico a 0,9% para serem administrado em um cliente num período de 6 horas. A velocidade do gotejamento será:
- a) 30 gotas/minuto
  - b) 43 gotas/minuto
  - c) 55 gotas/minuto
  - d) 56 gotas/minuto
  - e) 60 gotas/minuto
23. Qual a alternativa **correta** em relação à técnica de injeção intramuscular?
- a) A técnica do bloqueio de ar previne o vazamento para o tecido subcutâneo.
  - b) O músculo Vastus Laterallis é contra indicado para aplicação de injeções intramusculares.
  - c) A via subcutânea proporciona uma absorção mais rápida que a intramuscular.
  - d) A divisão da nádega em quadrantes é segura para demarcar o local da aplicação da injeção no músculo dorso-glúteo.
  - e) A melhor área para a aplicação de injeção intramuscular é a região deltóide.
24. Com relação à esterilização e desinfecção de material, assinale a alternativa **correta**:
- a) A limpeza de objetos contaminados com material orgânico é feita primeiramente com água quente
  - b) A opção pela desinfecção ou pela esterilização do material não depende do grau de risco de infecção envolvido com o seu uso
  - c) A desinfecção elimina os esporos bacterianos
  - d) Os objetos críticos devem ser esterilizados
  - e) As alternativas **a** e **d** estão corretas
25. Sr J.M.S, 60 anos, está com dificuldade de deglutição e necessita de sonda nasogástrica para alimentação. Analisar as afirmativas abaixo e assinale a opção **correta**:
- I. A sonda nasogástrica deve ser inserida até a marca determinada pela medida da distância da ponta do nariz ao lobo da orelha e daí, ao processo xifóide do esterno.
  - II. O método da ausculta é confiável para testar o posicionamento da sonda no estômago.
  - III. As sondas gástricas devem ser resfriadas antes da inserção.
  - IV. Lubrificantes hidrossolúveis são usados para lubrificar a extremidade da sonda.
- a) As afirmativas I e IV estão corretas.
  - b) As afirmativas I e III estão corretas.
  - c) As afirmativas II e III estão corretas
  - d) As afirmativas II e IV estão corretas
  - e) As afirmativas III e IV estão corretas.

26. Qual a alternativa **correta** quanto aos cuidados ao cliente com sonda vesical de demora?

- a) Deve-se fazer irrigação vesical três vezes ao dia para prevenir infecção
- b) Deve-se ordenhar a sonda diariamente no sentido bolsa coletora – cliente com a finalidade de evitar a formação de sedimentos
- c) Recomenda-se fazer instilação vesical duas vezes ao dia para eliminar sedimentos acumulados
- d) Deve-se pesquisar episódios de incontinência intestinal
- e) Deve-se evitar a limpeza ao longo do comprimento da sonda

27. Leia as três afirmativas abaixo sobre a alimentação por sonda nasogástrica:

- I. Antes de administrar a alimentação, as secreções gástricas devem ser aspiradas e medidas.
- II. É contra indicado irrigar a sonda com água após administrar a alimentação.
- III. Náuseas e vômitos são complicações da alimentação por sonda.

Marque a alternativa **correta** em relação às afirmativas acima:

- a) Apenas a afirmativa I é correta.
- b) As afirmativas I e II são corretas
- c) As afirmativas II e III são corretas
- d) As afirmativas I e III são corretas
- e) Todas as afirmativas são corretas.

28. Sr. S.M.P, idoso, hemiplégico, consciente, orientado encontra-se acamado e dependente de cuidados domiciliares. Sobre o posicionamento na cama leia as afirmativas abaixo e marque a alternativa **correta**:

- I. A mão do lado afetado deve ser mantida em pronação.
- II. A posição de decúbito ventral é contra-indicada para o Sr. S.M.P.
- III. Os pés devem ficar em ângulo reto com as pernas quando o paciente estiver em decúbito dorsal.
- IV. Evitar que o braço afetado se mantenha colado ao corpo

Em relação às afirmativas acima:

- a) As afirmativas I e IV estão corretas.
- b) As afirmativas I e III estão corretas.
- c) As afirmativas II e III estão corretas
- d) As afirmativas II e IV estão corretas
- e) As afirmativas III e IV estão corretas.

29. A enfermeira do PSF foi solicitada para fazer um cateterismo vesical em uma cliente que se encontra enferma no domicílio. Leia as afirmativas e marque a opção **correta**.

- I. O calibre do cateter vesical para mulheres deverá ser maior do que para homens.
- II. O soro fisiológico é indicado para encher o balão do cateter vesical de demora
- III. Se a cateterização for intermitente utilizam-se os cateteres plásticos

Em relação às afirmativas acima:

- a) Apenas a afirmativa I é correta.
- b) Apenas a afirmativa III é correta.
- c) As afirmativas II e III são corretas
- d) As afirmativas I e III são corretas
- e) Todas as afirmativas são corretas.

30. Qual a alternativa **incorreta** em relação aos cuidados com feridas?
- a) Solução de povidine e água oxigenada são tóxicas para os fibroblastos e não devem ser usadas para limpeza das feridas
  - b) Abrasões e pequenas lacerações devem ser limpas primeiramente em água corrente e depois com água e sabão neutro
  - c) O curativo deve deixar a ferida um pouco molhada para promover a migração das células epiteliais
  - d) A limpeza de feridas é feita da área mais contaminada para a menos contaminada
  - e) Na remoção de um curativo a área onde está a ferida deve ser umidificada com soro fisiológico
31. Com relação à medida da pressão arterial no braço de um adulto utilizando o método da ausculta, assinale o passo **correto**:
- a) Posicionar o diafragma do estetoscópio sobre a artéria radial.
  - b) Orientar o repouso de 3 minutos antes da verificação.
  - c) Aferir a pressão em ambos os braços caso a medida esteja sendo verificada pela primeira vez.
  - d) Em caso de dúvida aferir a pressão arterial várias vezes seguidas no mesmo braço.
  - e) Se a aferição da medida sistólica ou diastólica não for adequadamente percebida, deve-se inflar novamente o manguito sem deixar sair todo o ar inflado anteriormente.
32. Os diuréticos tiazídicos são drogas utilizadas no tratamento inicial da hipertensão arterial de idosos. Qual seu efeito adverso?
- a) Hipopotassemia
  - b) Tosse
  - c) Bradicardia
  - d) Modificações do paladar
  - e) Aumento do apetite
33. A tuberculose pulmonar é transmitida por meio de:
- a) Manuseio de utensílios domésticos utilizados pelo portador
  - b) Contato direto com o portador em qualquer fase da doença
  - c) Ingestão de água e alimentos contaminados por secreção
  - d) Contatos com fezes e urina do portador
  - e) Gotículas de saliva do portador de lesões ativas no aparelho respiratório
34. O teste tuberculínico é realizado:
- a) Por via subcutânea
  - b) Por escarificação
  - c) Por via intradérmica
  - d) Por via intramuscular
  - e) As opções **b e d** estão corretas
35. Sra. D.M.P é diabética tipo 2 e procurou a Unidade Básica de Saúde da Família com uma ferida no pé esquerdo. Após o exame do pé a enfermeira classificou como “pé neuro-isquêmico” porque identificou:
- a) Ausência de pulso tibial posterior, rubor postural e palidez com a elevação da perna.
  - b) Calosidades e ausência dos reflexos tendinosos.
  - c) Insensibilidade ao frio e ao calor e diminuição do pulso pedioso.
  - d) Pigmentação no terço inferior das pernas e unhas hipotrofiadas.
  - e) Anidrose e dedos em garra.

36. Para um portador de diabetes mellitus foi prescrita uma dose de 5 unidades de insulina regular e 15 unidades de insulina NPH, diariamente antes do café da manhã. Qual a orientação **correta** para o preparo da dose?
- a) Colocar as duas insulinas na mesma seringa porque a mistura não interfere na ação desejada
  - b) Utilizar uma seringa para cada insulina porque a mistura das insulinas na mesma seringa é contra indicada
  - c) Utilizar a mesma seringa e aspirar primeiro a insulina NPH
  - d) Utilizar a mesma seringa sem levar em conta a ordem de aspiração porque trata-se de duas insulinas modificadas
  - e) As afirmativas **a** e **d** estão corretas.

37. A dose prescrita na questão anterior deverá ser administrada pela via

- a) Intravenosa
- b) Intramuscular
- c) Subcutânea
- d) Intradérmica
- e) As afirmações **c** e **d**

38. A incidência da doença de Parkinson vem aumentando nas pessoas acima de 65 anos. Leia as afirmativas abaixo e marque a opção **correta**:

- I. A doença de Parkinson tem causa e cura conhecida
- II. Tremor, rigidez muscular e bradicinesia são manifestações clínicas motoras da doença de Parkinson
- III. Levodopa-Carbidopa são fármacos utilizados no tratamento da doença de Parkinson.

Em relação às afirmativas acima:

- a) Apenas a afirmativa I é correta.
- b) As afirmativas I e II são corretas
- c) As afirmativas II e III são corretas
- d) As afirmativas I e III são corretas
- e) Todas as afirmativas são corretas.

39. Sr. T.O.A. é portador de hanseníase Virchowiana e compareceu a Unidade Básica de Saúde da Família para uma consulta de rotina. Em relação à hanseníase, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Os indivíduos com hanseníase Virchowiana apresentam reação de Mitsuda negativa
- b) A forma Virchowiana é multibacilar
- c) As lesões iniciais da hanseníase Virchowiana apresentam alterações da sensibilidade
- d) A forma Virchowiana é contagiosa
- e) No estágio mais tardio da hanseníase Virchowiana é comum a ginecomastia e a atrofia testicular

40. No que diz respeito a prevenção das doenças relacionadas ao trabalho, analise as afirmativas abaixo e escolha a opção **correta**:

- I. As lesões por esforços repetitivos podem ser prevenidas com orientação postural e ginástica compensatória
- II. Medidas de higiene individuais e coletivas são fundamentais para prevenir a intoxicação por mercúrio
- III. O chumbo não ultrapassa a placenta logo a prevenção no recém-nascido não é necessária

Em relação às afirmativas acima:

- a) Apenas a afirmativa I é correta.
- b) As afirmativas I e II são corretas
- c) As afirmativas II e III são corretas
- d) As afirmativas I e III são corretas
- e) Todas as afirmativas são corretas.

41. Assinale a opção **correta** em relação ao suporte básico da vida:

- a) Nas compressões torácicas, o tempo de compressão é maior do que o tempo de descompressão
- b) Se há apenas 1 (um) socorrista fazer 15 compressões torácicas e 2 ventilações boca-a-boca
- c) Se há 2 (dois) socorristas, fazer 5 compressões torácicas e 2 ventilações boca-a-boca
- d) O primeiro cuidado no atendimento ao paciente é a implementação de um acesso venoso.
- e) A superfície utilizada para o posicionamento da vítima não interfere na efetividade da reanimação.

42. Sobre o exame físico, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa **correta**:

- a) A percussão avalia o tamanho, as bordas e a consistência dos órgãos e identifica a presença de líquidos nas cavidades corporais
- b) Na ausculta, a campânula do estetoscópio é indicada para ouvir os sons de alto volume como os pulmonares e os intestinais
- c) A inspeção e o exame de marcha, posição corporal, força e movimentos dos membros são evidências imprecisas da condição neurológica.
- d) A posição de Sims é indicada para examinar o trato genital feminino
- e) A inspeção do abdome permite identificar a presença de achados tais como obstrução, distensão, ascite e visceromegalias.

43. Leia as afirmativas abaixo sobre o Processo de Enfermagem e assinale a alternativa **correta**:

- I. O Processo de Enfermagem é um método de resolução de problemas e não um processo de tomada de decisão
- II. As etapas do Processo de Enfermagem não têm relação com as etapas do método científico
- III. O fator relacional é dispensável na elaboração do diagnóstico de enfermagem
- IV. O diagnóstico de enfermagem descreve a resposta atual ou potencial do cliente a um problema de saúde

Em relação às afirmativas acima:

- a) As afirmativas I e IV estão corretas.
- b) As afirmativas I e III estão corretas.
- c) As afirmativas II e III estão corretas
- d) As afirmativas II e IV estão corretas
- e) As afirmativas III e IV estão corretas.

44. De acordo com o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN N° 240/00), é dever do enfermeiro:

- a) Respeitar e reconhecer o direito do cliente de decidir sobre sua pessoa, seu tratamento e seu bem estar
- b) Associar-se às entidades de Classe
- c) Recusar-se a executar atividades que não sejam da sua competência legal
- d) Manter-se atualizado ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais em benefício da clientela, coletividade e do desenvolvimento da profissão
- e) Suspender suas atividades quando a instituição pública ou privada para qual trabalhe não oferecer condições mínimas para o exercício profissional

45. De acordo com a Lei n° 7498 de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem, é atividade privativa do enfermeiro:

- a) prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem
- b) cuidados diretos de enfermagem a pacientes com riscos de vida
- c) Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral
- d) Educação visando à melhoria de saúde da população
- e) As alternativas a e b estão corretas

46. Em relação à reforma da atenção à saúde mental é **incorreto** afirmar:

- a) Ao longo da história da assistência psiquiátrica no Brasil tem predominado a assistência individual, sem levar em consideração as implicações do empenho afetivo e do cuidado dos familiares no decorrer do tratamento da pessoa doente.
- b) Em oposição ao hospitalocentrismo, na perspectiva da Reforma Psiquiátrica a lógica é de assistência extra-hospitalar e interdisciplinar presidida pelo pressuposto de alcance da cidadania plena da pessoa que sofre de doença mental.
- c) Na nova lógica assistencial, a internação psiquiátrica deve ser adotada toda vez que a pessoa esteja em uma crise tal que represente risco para si própria e para os que convivem com ela.
- d) Na nova lógica assistencial, a internação psiquiátrica deve ser adotada somente quando tiverem sido esgotados todos os recursos comunitários e se os familiares não dispuserem de estrutura no próprio domicílio ou do suporte de uma equipe ou serviço de referência para manter o doente em seu ambiente corriqueiro.
- e) No Ceará, a Reforma Psiquiátrica tem avançado bem mais em cidades do interior do que na capital e um dos indicadores desta realidade é o grande número de serviços alternativos (CAPS) em várias dessas cidades.

47. Em relação à assistência em saúde mental comunitária, é **incorreto** afirmar:

- a) No Ceará o desenvolvimento de ações de saúde mental por parte das equipes do PSF representa uma estratégia complementar de consolidação da Reforma Psiquiátrica, tendo em vista que a rede de serviços de saúde mental nos diversos municípios não é suficiente para atender todas as demandas da população.
- b) Acompanhamento de egressos de hospitais psiquiátricos, identificação e seguimento de casos de transtornos mentais leves e moderados e coordenação de grupos de hipertensos, de adolescentes e de idosos são exemplos das muitas ações com enfoque de saúde mental que o enfermeiro pode desenvolver na atenção básica de saúde.
- c) Como o uso de benzodiazepínicos é uma prática muito difundida entre pessoas com algum tipo de demanda emocional, uma medida inicial de saúde mental em uma unidade básica de saúde é levantar a extensão dessa prática na área adstrita e estabelecer metas condizentes com a realidade identificada e com a qualificação da equipe de saúde.
- d) Conhecidas as pessoas que já vêm fazendo uso de benzodiazepínicos, é necessário manter a prescrição conforme a dosagem corriqueira, uma vez que a dependência já é um fato.
- e) Conhecidas as pessoas que já vêm fazendo uso de benzodiazepínicos, são medidas para serem adotadas em curto prazo: prescrever racionalmente; programar a redução progressiva e retirada, se possível; realizar abordagem conscientizadora e educativa em consultas individuais e com a família.

48. Sobre o conhecimento e as ações específicas de saúde mental das diversas categorias que trabalham no Programa Saúde da Família é **correto** afirmar:

- a) Não há diferença no conhecimento e no modo de agir em saúde mental no modelo anterior à Reforma Psiquiátrica e no modelo atual.
- b) No desenvolvimento de ações de saúde mental por parte das equipes do PSF são completamente distintos os conhecimentos e ações desenvolvidos por cada categoria profissional.
- c) Tanto quanto anteriormente, ainda hoje a internação psiquiátrica e o tratamento preferencial em serviço especializado continuam tendo indicação prioritária para os casos de transtornos mentais moderados e severos.
- d) Os profissionais de nível superior devem saber as bases da psicofarmacologia, mecanismos de ação dos medicamentos, doses, efeitos colaterais e manejo dos mesmos; os agentes de saúde devem reconhecer a apresentação física dos medicamentos, suas cores, embalagens, sinônimos, efeitos, modo de usar e cuidados ao guardá-los em casa.
- e) Todas as quatro opções anteriores são corretas.

49. Qual a alternativa **incorreta** em relação às manifestações de esquizofrenia?

- a) Primeiras manifestações ocorrem ainda na adolescência e em adultos bastante jovens.
- b) Modificações flutuantes do humor com predomínio de um pólo em que a energia para a realização de projetos parece inesgotável.
- c) Evidente dificuldade de desenvolver relações significativas e de manifestar sentimentos.
- d) Delírios e alucinações que se estruturam progressivamente.
- e) Presença de ecolalias e de neologismos.

**AS QUESTÕES 50 e 51 REFEREM-SE AO SEGUINTE CASO CLÍNICO:**

Verônica, 27 anos, compareceu a uma Unidade de Saúde da Família acompanhada de uma vizinha. Ela disse que perdeu um encaminhamento que o CAPS da cidade fez para a equipe da Unidade. Ela informa que há cerca de dois anos e meio morreu o companheiro com quem ela viveu durante três anos. Logo após a morte, ela se sentiu muito triste e desanimada. Como não conseguia reagir, parou de trabalhar como diarista e essa situação de desânimo chegou a tal ponto que em uma noite ela tentou se matar. Foi socorrida pelos vizinhos que a levaram para um hospital de emergência da cidade. De lá foi encaminhada para o CAPS onde se tratou até o mês passado. Teve melhora sensível, embora no decorrer do tratamento tenha tido fases em que se sente eufórica, chegando a fazer planos de muitas realizações e a contrair algumas dívidas que tem dificuldades de pagar. Há quase um ano encontra-se em situação estável, voltou a trabalhar há cerca de seis meses e continua tomando medicamentos. Foi encaminhada para ser acompanhada pela equipe da Unidade de Saúde da Família.

50. O quadro descrito é sugestivo de:

- a) Transtorno de estresse pós-traumático
- b) Transtorno obsessivo-compulsivo
- c) Transtorno do humor
- d) Esquizofrenia
- e) Transtorno de pânico

51. Qual a conduta mais apropriada diante do caso?

- a) O uso da medicação é importante para que a cliente mantenha-se estável, mas outros recursos como grupos e oficinas terapêuticas devem ser acrescentados.
- b) O transtorno está em fase aguda e deve ser devolvido ao CAPS.
- c) O transtorno já tem características de cronicidade e deve ser tratado em hospital psiquiátrico.
- d) Como o quadro já se estabilizou, a medicação deve ser suspensa e o acompanhamento pode se restringir a consultas individuais a cada dois meses.
- e) Todas as opções acima são falsas.

52. Com relação aos métodos contraceptivos, assinale a afirmativa **incorreta**:

- a) O índice do fracasso contraceptivo refere-se à porcentagem de usuárias expostas a uma gravidez imprevista durante o primeiro ano, mesmo fazendo uso consistente e correto do método;
- b) Os índices de falha diminuem com o tempo, porque a usuária adquire experiência e utiliza o método mais apropriadamente, ou porque a usuária menos efetiva deixa de usá-lo;
- c) Comprometimento com o método, previsão de proteção a curto e a longo prazo e frequência da relação sexual são fatores que afetam a eficácia do método.
- d) A eficácia dos métodos contraceptivos depende tanto das propriedades específicas de cada método quanto das características de quem usa;
- e) A segurança de um método depende da história de vida da usuária, número de filhos, idade e tabagismo

53. Qual a alternativa **correta** em relação ao método de temperatura basal?
- a) A temperatura basal é a mais baixa de uma pessoa saudável, verificada imediatamente após acordar e antes de levantar-se da cama;
  - b) A temperatura basal geralmente varia de 36,2°C a 37°C na menstruação e durante os cinco a sete dias posteriores aproximadamente;
  - c) Próximo à ovulação ocorre uma ligeira elevação da temperatura e após a ovulação discreta queda da temperatura;
  - d) A temperatura permanece em um platô baixo até dois a quatro dias antes da menstruação;
  - e) Sua verificação pode ser retal, anal ou vaginal, sendo necessário um repouso mínimo de 8 horas.
54. São princípios usados no sistema de convocação de parceiros nos tratamentos das DST:
- a) Confidencialidade;
  - b) Ausência de coerção;
  - c) Proteção contra discriminação;
  - d) Legalidade da ação;
  - e) Todas estão corretas
55. S.M.A, 18 anos, nulípara, início da atividade sexual aos 16 anos, 2 parceiros nos últimos 3 meses, compareceu ao ambulatório de ginecologia com história de corrimento vaginal purulento e de odor fétido há aproximadamente 20 dias. Ao exame apresentou teste das aminas positivo e pH > 4,5. Qual a melhor conduta a ser tomada:
- a) Tratar candidíase;
  - b) Tratar tricomoníase;
  - c) Tratar vaginose bacteriana;
  - d) Tratar tricomoníase e vaginose bacteriana;
  - e) Tratar clamídia e gonorréia
56. Qual a alternativa **correta** em relação às doenças sexualmente transmissíveis?
- a) As complicações mais sérias da infecção por Clamídia são salpingite aguda ou DIP
  - b) A obesidade, a gravidez e o uso de antibióticos, são alguns dos fatores predisponentes da tricomoníase genital
  - c) O tratamento da Candidíase é doxicilina 100mg, VO de 12/12 hs
  - d) Herpes genital em gestante deve ser tratado somente após o 1º trimestre com metronidazol, 2g, dose única
  - e) Febre, cefaléia, dor e/ou ardência na urina e adenopatia são alguns dos sintomas do linfogranuloma venéreo
57. Qual a alternativa **correta** em relação ao conceito do termo *Paridade*, em saúde reprodutiva?
- a) Capacidade de o feto sobreviver fora do útero após a 22ª semana do ultimo período menstrual.
  - b) O número de gestações nas quais o feto ou os fetos tenham atingidos a viabilidade, e não o número de fetos nascidos
  - c) O número de fetos nascidos em uma gestação;
  - d) O número de fetos nascidos em qualquer idade gestacional;
  - e) O número de partos independente da viabilidade e do numero de fetos nascidos
58. Considerando a gonodotrofina coriônica humana (hCG) o marcador biológico em que se baseiam os teste de gestação, podemos afirmar que:
- a) A sua produção inicia desde o dia da implantação, podendo ser detectada com 30 dias depois da última menstruação;
  - b) A sua produção inicia desde o dia da implantação, podendo ser detectada no sangue 6 dias depois da concepção
  - c) A sua produção inicia desde o dia da implantação, podendo ser detectada na urina aproximadamente 45 dias após a concepção;
  - d) Seu pico máximo esta entre o 45º e o 70º dia de gestação e o mais baixo entre o 100º e o 130º dia;
  - e) Nenhuma das afirmativas anteriores esta correta

- 59.** Qual a alternativa **correta** acerca das modificações ocorridas no organismo da mulher durante o período gestacional?
- a) O amolecimento e a compressibilidade do corpo do útero ocasiona uma anteflexão uterina exagerada nos 3 primeiros meses de gravidez resultando no aumento da frequência urinária (polaciúria);
  - b) Bradicardia reflexa, débito cardíaco reduzidos, náuseas, vômitos e sensação de desfalecimento em mulheres em decúbito dorsal, são condições da síndrome da hipotensão supina;
  - c) O aumento do plasma excedendo a produção de eritrócitos ocasiona uma diminuição nos valores normais da hemoglobina e do hematócrito caracterizando a anemia fisiológica da gestação;
  - d) Nas alterações respiratórias podemos observar volume corrente aumentado em 30 a 40%, aumento do consumo de oxigênio, capacidade inspiratória diminuída;
  - e) Considera-se o aumento do hormônio melanotrófico da hipófise posterior responsável pela hiperpigmentação do sistema tegumentar.
- 60.** A duração de uma gestação compreende a 9 meses solares, 10 meses lunares ou aproximadamente 40 semanas, que dividem-se em 3 trimestres, ou seja:
- a) 1º trimestre – 1 a 13 semanas / 2º trimestre – de 14 a 27 semanas / 3º trimestre – 28 até o termo da gestação;
  - b) 1º trimestre – 1 a 12 semanas / 2º trimestre – de 13 a 26 semanas / 3º trimestre – acima da 28 semanas até a 39ª semana;
  - c) 1º trimestre – 1 a 12 semanas / 2º trimestre – de 14 a 24 semanas / 3º trimestre – acima de 27 até o termo;
  - d) 1º trimestre – abaixo de 12 semanas / 2º trimestre – de 13 a 24 semanas / 3º trimestre – acima de 29 a 40;
  - e) 1º trimestre – abaixo da 13 semanas / 2º trimestre – de 14 a 26 semanas / 3º trimestre – de 27 a 41 semanas.
- 61.** Considerando os exames laboratoriais de rotina na assistência Pré-Natal, a conduta mais apropriada é:
- a) Em caso de Mãe Rh negativo e parceiro Rh positivo, solicitar teste de Coombs indireto - se negativo, repeti-lo a cada 2 semanas a partir da 24ª semana;
  - b) No caso de Mãe Rh negativo e parceiro Rh desconhecido, solicitar teste de Coombs indireto - se negativo, repeti-lo na 37ª semana;
  - c) Em paciente VDRL positivo – sífilis primária, deve-se trata-lo com penicilina benzatina 2.400.000 UI gestante e, caso o parceiro apresente-se VDRL negativo, repetir somente em casos de aborto;
  - d) Quando a hemoglobina materna for menor que 11g/dl e maior ou igual a 8g/dl, deve-se tratar parasitoses, iniciar sulfato ferroso (3 drageas/dia) e repetir dosagem entre 30 e 60 dias
  - e) Em caso de presença de traços de proteinúria no exame de urina tipo I, deve-se repetir a coleta e exame após 7 dias.
- 62.** Na consulta de enfermagem do dia 13/11/2005 a senhora M.A.R. informou que sua última menstruação foi dia 25 de setembro de 2005. Segundo a regra de Nägele, a data provável do parto e a Idade gestacional dessa senhora neste é:
- a) 05 de junho de 2006/ aproximadamente 5 semanas de gestação;
  - b) 30 de junho de 2006/ aproximadamente 7 semanas
  - c) 02 de julho de 2006 / aproximadamente 6 semanas de gestação;
  - d) 02 de julho de 2006 / aproximadamente 7 semanas de gestação;
  - e) 04 de julho de 2006 / aproximadamente 8 semanas
- 63.** As Manobras de Leopold ajudam a identificar:
- a) Atitude e apresentação fetal
  - b) Nº de fetos e encaixe fetal
  - c) Localização da frequência cardíaca fetal e situação fetal
  - d) Apenas A e B estão corretas
  - e) Todas estão corretas

64. Com relação a menopausa/climatério, leia as afirmativas abaixo e assinale a **correta**:
- a) Mulheres pós-menopáusicas não são totalmente deficientes de estrogênio
  - b) Considera-se menopausada a mulher cujo último período menstrual foi identificado após 2 anos de amenorréia;
  - c) Ocorre em média aos 50 anos dependendo da idade da menarca, paridade e uso de anovulatório;
  - d) O tabagismo pode antecipar sua ocorrência em 5 anos;
  - e) Patologias do endométrio são raras nesse período.
65. Considerada a neoplasia maligna feminina mais freqüente em países em desenvolvimento e população de baixa renda, com relação ao câncer de colo de útero, assinale a resposta **correta**:
- a) O tipo histológico mais freqüente é o adenocarcinoma que se desenvolve no epitélio colunar da endocérvice;
  - b) Tem como sintoma característico o sangramento transvaginal pós-coito anormal;
  - c) O carcinoma epidermóide dificilmente é detectado nas formas pré-invasora de neoplasia intra-epitelial;
  - d) Em mulheres de 25 a 60 anos, com dois exames consecutivos anuais negativo, a citologia deve ser realizada a cada 3 anos.;
  - e) No exame especular podemos identifica tanto o carcinoma invasor como as neoplasias intra-epiteliais.
66. Os óbitos por câncer de mama no Brasil representam 2/3 de todas as causa de morte e seus sintomas mais comuns são:
- a) Nódulo indolor, assimetria e derrame papilar;
  - b) Nódulo indolor, assimetria e alterações de contorno;
  - c) Fibroadenoma, retração cutânea ou papilar e nódulos cutâneos satélites;
  - d) Infiltração, retração papilar e dor mamária;
  - e) Endurecimento, Fibroadenoma e nódulos cutâneos satélites.
67. Quanto ao Aleitamento Materno, marque a opção **correta**:
- a) A mãe deve ser preparada para amamentar a partir do oitavo mês de gestação, momento em que o profissional de saúde deve estar atento às suas crenças e experiências anteriores sobre a amamentação.
  - b) Durante o sexto mês de gestação a mãe deve extrair o colostro para melhorar a permeabilidade dos ductos e facilitar a sucção para a criança.
  - c) O aleitamento materno predominante é aquele em que a criança recebe somente o leite materno diretamente da mãe ou extraído, e nenhum outro líquido ou sólido, com exceção de gotas ou xaropes de vitaminas, minerais e medicamentos.
  - d) A amamentação deve ser descontinuada nos casos em que a criança adocece, independentemente da gravidade do caso, pois o ato de sugar a fará perder energias, o que pode ocasionar piora no seu quadro clínico.
  - e) Ao promover o aleitamento materno, o enfermeiro deve estar atento às técnicas de comunicação com a mãe demonstrando que está ali para ajudar e não para julgar.
68. As vacinas BCG-ID, Hepatite B e Tetravalente (DTP + Hib) devem ser administradas pelas seguintes vias, respectivamente:
- a) Intramuscular, Intradérmica, Intramuscular
  - b) Intradérmica, Intramuscular, Intramuscular
  - c) Intramuscular, Intradérmica, Subcutânea
  - d) Subcutânea, Intramuscular, Intradérmica
  - e) Intradérmica, Subcutânea, Intramuscular

69. A vacina que deve ser administrada ainda na maternidade e tem como esquema básico 3 doses, com intervalo de 30 dias da primeira para segunda dose, e de 180 dias da primeira para a terceira dose é:
- BCG
  - VOP
  - Tetravalente
  - Hepatite B
  - Hib
70. Com relação à conservação das vacinas, marque a afirmativa **correta**:
- Em unidades de saúde mais simples, é possível compartilhar o refrigerador para uso da imunização e do laboratório.
  - Em nível local, as vacinas devem ser mantidas numa temperatura entre +4 e +8.
  - Na arrumação do refrigerador, deve-se retirar as gavetas plásticas, caso existam, e em seu lugar colocar 12 garrafas com água, pois contribuem para a lenta elevação da temperatura.
  - Entre as vacinas que podem congelar e não se deterioram estão a BCG, Hepatite B e Pólio.
  - A vacina BCG é apresentada sob a forma liofilizada e sua conservação após aberto o frasco é de até 30 dias, sob refrigeração.
71. Quanto à alimentação complementar que deve ser iniciada a partir do sexto mês de vida, marque a alternativa **correta**:
- Inicia-se com frutas, de preferência, ácidas e sempre maduras.
  - As sopas e mingaus devem ter consistência espessa, pois alimentos mais ralos são mais calóricos.
  - É recomendável que a criança ainda amamentada no peito, deva receber três refeições diárias de alimentos complementares e as não amamentadas, cinco refeições.
  - Os alimentos de origem animal devem constar na refeição da criança, são baratos e de fácil acesso.
  - Todas as opções são falsas.
72. Quanto à avaliação do crescimento físico da criança, marque a alternativa **correta**:
- O peso é considerado o segundo melhor parâmetro de crescimento da criança.
  - Crianças com peso acima do percentil 95 para a idade são consideradas obesas.
  - Crianças com evolução de peso e altura entre o percentil 10 e 90 apresentam crescimento adequado.
  - O ganho de peso aumenta sua velocidade no segundo semestre de vida.
  - Crianças com peso abaixo do percentil 3 para a idade são consideradas desnutridas.
73. Identifique a alternativa abaixo que se apresenta **incorretamente** como parâmetro de avaliação de crescimento físico em crianças:
- Peso
  - Perímetro Torácico
  - Perímetro Cefálico
  - Perímetro braquial
  - Comprimento
74. Quanto ao desenvolvimento da criança, marque a opção **incorreta**:
- Em torno dos quatro meses de idade, os lactentes podem sentar-se sozinhos, inclinando-se para diante sobre suas mãos.
  - Em torno de doze a treze meses de idade, os infantes caminham sozinhos, usando movimentos largos para ampliar o equilíbrio.
  - Ao término do segundo ano de vida, a criança consegue subir escadas alternando os pés.
  - Aos três anos de idade, o pré-escolar anda de triciclo e caminha na ponta dos pés.
  - Aos cinco anos, a criança salta em pés alternados e pula corda.

75. Em relação ao uso de drogas, entre crianças e adolescentes, marque a opção **incorreta**:
- a) A proporção de usuários de drogas entre jovens mantém estreita relação com as situações de violência em casa.
  - b) As conseqüências do consumo de drogas estão relacionadas à violência, à disseminação do HIV e a doenças transmitidas por contato pele a pele, como a escabiose.
  - c) O consumo abusivo de drogas está relacionado aos acidentes de trânsito e a ocorrência de envenenamentos.
  - d) Os fatores de risco para o uso de drogas podem estar relacionados a conflitos no ambiente familiar e no convívio social.
  - e) A proporção de usuários é maior em jovens que se encontram defasados nos estudos.
76. Marque a alternativa **correta** frente aos aspectos a serem avaliados durante a consulta de Enfermagem ao adolescente:
- a) Abordagem de características dos processos relacionais em família, mesmo sabendo que o comportamento do adolescente no lar, em geral, se caracteriza por busca de comunicação efetiva, passividade e obediência.
  - b) Identificação de características de auto-estima, aceitação, preocupação e distúrbios relacionados à imagem corporal.
  - c) Investigação rotineira de sorologia para o HIV em adolescentes que iniciaram atividade sexual precoce.
  - d) Atenção para o padrão alimentar, buscando a relação com a anorexia, bulimia e obesidade.
  - e) Somente os itens b e d estão corretos.
77. Qual complicação é **incomum** na gravidez de adolescentes?
- a) Eclâmpsia
  - b) Nascimento de bebês de baixo peso
  - c) Parto pós-maturo
  - d) Aparecimento de anemia ferropriva
  - e) Desproporção cefalopélvica
78. Com relação à maturação sexual em meninas, o aparecimento dos brotos mamários é um evento conhecido como:
- a) Menarca
  - b) Adrenarca
  - c) Genarca
  - d) Pubarca
  - e) Telarca
79. Analise as questões abaixo e marque a opção **correta**:
- a) Na maioria dos casos de abuso sexual na infância o agressor é alguém externo à família da vítima e, os membros da família, geralmente, são as pessoas mais interessadas na denúncia do agressor.
  - b) Antes de realizar o exame físico da criança e/ou adolescente vítima de abuso sexual ou outros maus-tratos, deve ser providenciada higiene corporal para promover melhor conforto.
  - c) Em adolescentes, a mudança constante de humor e a rebeldia com os pais são sintomas característicos do abuso sexual.
  - d) Em crianças pequenas, a conivência da mãe com o indivíduo abusador é causa de dificuldade de identificação da situação de abuso.
  - e) É incomum a associação entre violência física e abuso sexual de crianças e adolescentes.

- 80.** A família é considerada uma unidade de cuidado para a enfermagem na saúde coletiva, tendo como marco de referência alguns fundamentos. Qual a alternativa **correta** em relação a estes fundamentos?
- a)** O cuidado à família deve ser centrado em um membro específico, desde que este seja o principal na constelação familiar.
  - b)** O conceito que o profissional tem de família não influencia na forma como as ações de intervenção serão desempenhadas.
  - c)** A família influencia o ambiente no qual está inserida sem, que este interfira nas suas funções e características.
  - d)** A família, independente da sua organização e funcionamento, é o grupo que tem maior influência na vida de cada membro.
  - e)** A cultura exerce pouca influência sobre os papéis e os padrões de comunicação familiar.

